Referenzintervalle und obere Grenzwerte für Blutwerte von Warmblütern und Ponys im Fuji DRI-CHEM NX500

Hayo Tongers, Natali Bauer, Kerstin Fey

Hintergrund & Ziele

Die Studie wurde von Fujifilm finanziell ermöglicht. Die „Point of Care“ Labordiagnostik nimmt auch beim Pferd einen immer größeren Stellenwert ein¹. Meist liegen jedoch keine gerätespezifischen Referenzintervalle vor. Ziel war es, für das Fuji DRI-CHEM NX500 Trockenchemie POCT System (Fujifilm Cooperation, Tokyo, Japan) unter Einhaltung der ASVCP-Leitlinien²

- gerätespezifische Referenzintervalle (RI) bzw. obere Grenzwerte für klinisch-chemische Blutparameter für erwachsene Warmblutpferde zu erstellen und
- diese mit den Werten von Ponys zu vergleichen.

Material & Methoden

- Analysegerät: Fuji DRI-CHEM NX500 Trockenchemie POCT System
- Probenmaterial: Serum- und Plasmaproben klinisch gesunder Warmblüter (n=123) und Ponys (< 130 cm, n=40)
- Analytik: 22 ausgewählte Parameter in maximal sechs Stunden
- Statistik: Referenzintervalle mittels Reference Value Advisor v2.1, obere Grenzwerte mit medcalc und weitere Analysen mit Microsoft Excel 365 und IBM SPSS

Ergebnisse

- Ammoniak (instabil) und α -Amylase (Angabe des Gerätes immer < 100 U/l) erbrachten keine validen Daten.
- Für 13 Parameter wurden die gerätespezifischen Referenzintervalle und für 6 Enzyme sowie die Triglyzeride obere Grenzwerte für Warmblutpferde bestimmt (siehe Balkendiagramme).
- Signifikante Unterschiede zwischen Warmblütern (n=123) und Ponys (n=40): Bilirubin bei Ponys niedriger, Kreatinin und Harnstoff mit größeren Spannweiten und alle Enzyme liegen bei Ponys höher.

Zusammenfassung

Für 20 Parameter liegen nun für Warmblüter Referenzintervalle bzw. obere Grenzwerte vor. Bei Ponys sind niedrigere Bilirubinwerte und z.T. Teil deutlich höhere Enzymwerte sehr wahrscheinlich physiologisch → für diese Parameter sollten eigene Grenzwerte mit mindestens 120 Probanden erstellt werden.

Quellen

¹ Slovis N. M., Browne N. und Bozorgmanesh R. (2020) Point-of-Care Diagnostics in Equine Practice. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice 36, 161–171
² Friedrichs K. R., Harr K. E., Freeman K. P., Szladovits B., Walton R. M., Barnhart K. F. und Blanco-Chavez J. (2012) ASVCP reference interval guidelines. Determination of de novo reference intervals in veterinary species and other related topics. Veterinary Clinical Pathology 41, 441–453
³ Fujifilm (2022) URL: <https://www.fujifilm.com/de/de/healthcare/in-vitro-diagnostics/chemical-analysis/dri-chem-nx500>

Kontakt

Hayo Tongers
 H.Tongers@gmx.de
 Klinik für Pferde – Innere Medizin
 Justus-Liebig-Universität Gießen
 Frankfurter Straße 126, 35392 Gießen

Kerstin Fey
 Kerstin.Fey@vetmed.uni-giessen.de
 Klinik für Pferde – Innere Medizin
 Justus-Liebig-Universität Gießen
 Frankfurter Straße 126, 35392 Gießen